

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA DE VACINAÇÃO COM LEISHMUNE

- Apenas cães saudáveis e soronegativos para Leishmaniose Visceral Canina devem ser vacinados.
- O programa vacinal com Leishmune deve ser iniciado a partir dos 4 meses de idade e consiste na aplicação de 3 doses com intervalo de 21 dias.
- A proteção contra a Leishmaniose Visceral Canina só é conferida 21 dias após a aplicação da 3 dose da vacina.
- Se o cão for picado por um mosquito contaminado durante este período, ele pode infectar-se.
- O período de incubação da Leishmaniose Visceral Canina é de, em geral, 2 a 5 meses, ou mesmo anos, podendo o animal, neste período, não apresentar qualquer manifestação clínica ou sorologia indicativas de infecção. A vacinação durante este período não protegerá o cão, uma vez que ele já estará infectado.
- Um teste ELISA negativo não isenta a possibilidade do animal estar infectado pelo protozoário, já que os testes sorológicos só são capazes de detectar anticorpos anti-Leishmania de 1,5 a 4 meses após a infecção. Desta forma, o cão pode estar infectado com Leishmaniose e soronegativo no momento da vacinação.
- A resposta adequada a qualquer vacinação é diretamente relacionada à competência imunológica de cada animal.
- A revacinação anual deve ser feita 1 ano após a primeira dose e repetida anualmente, proporcionando a manutenção da resposta imune.
- O Médico Veterinário é o único profissional capacitado e habilitado para instituir o programa de vacinação com a Leishmune.
- A Leishmune foi aprovada e registrada pelo Ministério da Agricultura sob o número 8627 em 11/06/03.